

Radicale excisie T1-2 N0 M0 rectumcarcinoom

Lokale onderzoeker
Informed consent + registratie patiënt
ALEA: T-nummer, geboortejaar, centrum

Centrale PA revisie VUmc
Koppeling op basis van T-nummer, geboortejaar, centrum

Randomisatie

Registratie
Watchful waiting

Adjuvante
Chemoradiatie
(binnen 4-12 weken)

TME
Chirurgie
(binnen 4-12 weken)

Intensieve
follow-up

Reguliere
follow-up

Studiecoördinator:

L.J.H. Smits

020-4443529 / 06-11011900 / l.j.smits@amsterdamumc.nl

INCLUSIE

1. Radicale lokale excisie (TEM/TAMIS/EMR/ESD/poliepectomie)
2. High risk pT1 of low risk pT2 tumor
3. Stadium T1-2N0M0 (MRI bekken, CT-abdomen, X-thorax)
4. Fit genoeg om operatie te ondergaan (WHO 0-2)

EXCLUSIE

1. Irradicale excisie (tumor in snijvlak), re-excisie toegestaan
2. pT1 < 3cm zonder risicofactoren, pT1 > 5 cm of pT2 > 3cm
3. Recidief of dubbel tumor
4. Eerdere pelvische radiotherapie
5. Aanwezigheid van andere maligniteit (minimaal 5 jaar ziektevrij)

Tumor Stadium	Differentiatie			Invasie		Grootte		Sm3 / Haggit 4	Budding / clustering
	Goed	Matig	Slecht	Lymfevat	Veneus	> 3cm	> 5cm		
pT1									
pT2									

Maanden	Follow-up schema									
	3	6	9	12	18	24	36	48	60	
Polikliniek	★	X	★	X	X	X	X	X	X	
CEA		X		X	X	X	X	X	X	
Sigmoidoscopie		★				★	★			
Colonoscopie				X				X		
MRI		★			★	X	★		★	
CT/X-thorax & CT/echo-abdomen		X		X	X	X	X	X	X	
Vragenlijsten	X	X		X		X	X			

X = Follow-up moment beide groepen (let op MRI na 24 maanden)

★ = Extra follow-up moment voor interventie groep (chemoradiatie)

